

**PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA
GOŁĘBI POCZTOWYCH**



**Centrum Zdrowia Gołębi
Gabinet Weterynaryjny**

VET-ANIMAL

ul. Droga Owidzka 7

83-200 Starogard Gdański

www.centrumzdrowiagolebi.pl

tel.: 600 473 376

fax. (058) 56 108 46

e-mail: gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl

**PREPARATY FIRMY FARMWET MOŻNA BEZPIECZNIE ŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ Z INNYMI
PREPARATAMI, GDYŻ NIE WCHODZĄ ONE W ŻADNE INTERAKCJE**

OD POŁOWY STYCZNIA DO KOŃCA KWIETNIA

1. Odrobaczanie, zapobieganie i leczenie trichomonadozy oraz szczepienia przeprowadzamy zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
2. Profilaktyka w kierunku zapobiegania zakażeniom E.coli, Salmonelli i innym bakteriom gram-ujemnym i gram-dodatnim.
3. Profilaktyka w kierunku paramyksowirozy: po ok. 10 dniach od zakończenia działań w kierunku zapobiegania zakażeniom E.coli itd. zaszczepić gołębie przeciwko paramyksowirozie szczepionką z przypisu lekarza weterynarii. Zaleca się również jednocześnie zaszczepić gołębie przeciwko ospie (metodą skaryfikacji w okolicy uda).
4. Po ok. 5-7 dniach od złożenia jajek podajemy profilaktycznie środki przeciw trichomonadozie (żółty guzek) i kokcydiozie.
5. W momencie, kiedy młode gołębie nauczą się jeść i pić, należy zastosować u nich kurację przeciw rzęsistkowicy i kokcydiozie.

DZIEŃ/ PREPARAT	Bio-Cal ¹	Fito-Liv ²	Immuno Plus ³	Myco-Liv ⁴	Omega 3-Vit ⁵	Oregomix ⁶	Diaromix ⁷	Diaromix Plus ⁸
pon				x		X		
wt				x		X		
śr				x	X			
czw				x	X			
pt			X	x				
sob			X	x				
niedz		X		x				

¹ Podawać: profilaktycznie 1 ml/1 litr wody przez 10 dni w miesiącu; interwencyjnie 2ml/ 1 litr wody przy problemach z jakością jaj przez okres 10 dni (szczególnie zalecany w okresie rozrodu).

² Może być stosowany zamiennie z preparatem Myco-Liv. Podawać: profilaktycznie 2ml/1 litr wody; interwencyjnie 4ml/1 litr wody przez okres 5 dni

³ Podawać w proporcji 2ml/1 litr wody 5 dni przed i 5 dni po szczepieniu; podawać profilaktycznie w proporcji 2ml/1 litr wody dwa razy w tygodniu; podawać interwencyjnie 4ml/1 litr wody w okresie wystąpienia schorzeń bakteryjnych i wirusowych (do 10 dni)

⁴ Najwięcej korzyści daje codzienne stosowanie w proporcji 2g/1 kg karmy

⁵ Podawać profilaktycznie 10 ml/1 kg karmy dwa razy w tygodniu (szczególnie zalecany w okresie rozrodu)

⁶ Podawać w proporcji 1ml/1 litr wody

⁷ Stosować w proporcji 4g/1 kg karmy w przypadku wystąpienia biegunki, aż do ustąpienia jej objawów (profilaktycznie 2 dni w miesiącu)

⁸ Może być stosowany zamiennie z preparatem Diaromix. Zalecane podawanie 2 dni w miesiącu samej karmy Diaromix Plus lub w proporcji 1/5 ze zwykłą karmą.